



Вакцинация (активная иммунопрофилактика) - комплекс мероприятий, направленных на формирование противoinфекционного иммунитета с помощью введения в организм человека антигена (АГ) возбудителей инфекционных болезней. Вакцинация признана ВОЗ идеальной методикой профилактики заболеваний человека.

В клинике «ММЦ» проводится иммунизация от наиболее распространённых инфекций:

Грипп — вакцина Ультрикс Квадри — штаммовый состав обновлён в соответствии с рекомендациями ВОЗ на текущий эпидемический сезон, вакцина формирует развитие специфического иммунитета к актуальным штаммам гриппа типов А и В, иммунитет вырабатывается через 8-12 дней после вакцинации и сохраняется до 12 месяцев. Ежегодная профилактическая иммунизация против сезонного гриппа детей с 6-ти месячного возраста, подростков и взрослых до 60 лет.

Пневмококковая инфекция — вакцина «Превенар 13» — профилактика большинства заболеваний, вызываемых пневмококком, включая менингит, бактериемия, сепсис, тяжёлые пневмонии, внебольничные пневмонии, средний отит. Вакцинации подлежат дети с 2-х месячного возраста и взрослые, относящиеся к группе риска (лица, подлежащие призыву на военную службу, лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями, лица старше трудоспособного возраста, проживающие в организациях социального обслуживания).

Столбняк, дифтерия, коклюш, полиомиелит — вакцина «Инфаринкс гекса», «Адасель» — вакцинации подлежат дети с 3-х месячного возраста по схеме – 0 (3 месяца) – 45 дней (4,5 месяца) – 45 дней (6 месяцев), ревакцинация через 12 месяцев (18 месяцев). При нарушении сроков иммунизации проводят полный вакцинальный комплекс: 3-х кратная вакцинация (минимальный срок между введениями вакцины – 1 месяц) и ревакцинация через 12 месяцев после третьего введения вакцины. В последующем ревакцинацию проводят в 6-7 лет, 14 лет, и далее у взрослых каждые 10 лет. Перенесенные заболевания (дифтерия, столбняк, коклюш) не являются противопоказанием к вакцинации, так как не формируется стойкий иммунитет.

- **Корь, краснуха, паротит — вакцина «М-М-Р II»** — имеет высокие иммуногенные свойства, обеспечивает сохранение уровня антител в крови пациента более 11 лет. Вакцинации подлежат: дети в возрасте 1 года и старше против кори, паротита и краснухи; неиммунизированные против краснухи и не болевшие краснухой дети старше 1 года, беременные матери которых восприимчивы к краснухе; женщин детородного возраста, не имеющие иммунитета против краснухи; лица из групп повышенного риска (в т.ч. учащиеся, медицинские работники, военнослужащие).

Вакцинация проводится в нашем медицинском центре со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм после консультации врача-терапевта, врача общей практики, а в случае с иммунизации детей — врача-педиатра.

[Прием \(осмотр, консультация\) врача-педиатра перед вакцинацией](#)

[Прием \(осмотр, консультация\) врача терапевта/ВОП перед вакцинацией](#)