

	<b>ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ</b>	Ф-01-П-027/РН-СТ
		Per.№
<p><i>Уважаемый пациент!</i></p> <p><i>Просим Вас, соблюдать дополнительные требования при подготовке к инструментальным и диагностическим обследованиям.</i></p> <p><i>Пожалуйста, по возможности, более точно следуйте нижеуказанным рекомендациям, это поможет получить более достоверные данные о состоянии вашего здоровья.</i></p> <p><i>Приносим свои извинения за неудобства и ограничения на период времени, когда будут проводиться обследования.</i></p>		
<b>Наименование обследования</b>	<b>Ирригоскопия</b>	

В назначенный день обследования рекомендуется прийти натощак. Постарайтесь, пожалуйста:

- воздержаться от приема пищи, (можно пить сладкий чай, кипяченую воду).
- провести необходимую подготовку перед исследованием.

Возможны две разновидности подготовки (очищения) кишечника препаратом «Фортранс»:

### **1. Одноэтапная подготовка препаратом «Фортранс».**

#### Накануне (за день до исследования).

Необходимо исключить из рациона питания овощи, фрукты, картофель, ягоды, грибы, зелень.

#### В день ирригоскопии.

Можно лишь пить сладкий чай, кипяченую воду.

В зависимости от веса пациента (до 50 кг - 2 пакетика, 50–80 кг - 3 пакетика, свыше 80 кг - 4 пакетика) препарат разводится в кипяченой воде комнатной температуры из расчета 1 пакетик на 1 литр воды. Необходимое количество раствора выпивается в день с 0.00-1.00 до 5.00-6.00 часов утра дробными порциями (стакан в 15-20 минут) – в зависимости от количества препарата и времени проведения исследования. Раствор можно запивать кипяченой водой. Стул начинает отходить через 1,0-1,5 часа после начала приема препарата и прекращается через 2-3 часа после приема последней дозы препарата.

### **2. Двухэтапная подготовка препаратом «Фортранс».**

Подготовка проводится как накануне ирригоскопии, так и в день проведения исследования.

Накануне (за день до исследования). Разрешается завтрак до 12 часов дня (манная каша, йогурт, яичница, чай).

После 12.00 разрешается прозрачный бульон, чай, кипяченая вода.

В зависимости от веса пациента (до 50 кг - 1 пакетик, 50-80 кг - 2 пакетика, свыше 80 кг - 3 пакетика) препарат растворяется в кипяченой воде комнатной температуры из расчета 1 пакетик на 1 литр воды. Необходимое количество раствора выпивается с 17.00 до 20.00-21.00 дробными порциями (стакан в 15-20 мин). Раствор можно запивать кипяченой водой. Стул начинает отходить через 1,0-1,5 часа после начала приема препарата и прекращается через 1-3 часа после приема последней дозы препарата.

В день ирригоскопии.

С 7.00 до 9.00 часов утра выпивается еще 1 литр раствора из расчета 1 пакетик на 1 литр воды. После приема последней дозы препарата стул прекращается через 1-2 часа. Раствор можно запивать кипяченой водой.

**Внимание!** Проведение ирригоскопии возможно не ранее чем через 4 часа после последнего приема препарата!

В дни подготовки возможен прием необходимых лекарств, за исключением препаратов железа и активированного угля.

Ирригоскопия в ММЦ "СОГАЗ" может проводиться в условиях седации, т. е. кратковременного погружения в медикаментозный сон путем внутривенного введения препаратов под наблюдением опытных анестезиологов.

Пациентам старше 50 лет необходимо иметь при себе результаты ЭКГ.

В течение 24 часов после исследования под внутривенной анестезией не рекомендуется водить автомобиль.