

 МОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР	ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ	Ф-01-П-027/РН-СТ
		Per.№
<p><i>Уважаемый пациент!</i></p> <p><i>Просим Вас, соблюдать дополнительные требования при подготовке к инструментальным и диагностическим обследованиям.</i></p> <p><i>Пожалуйста, по возможности, более точно следуйте нижеуказанным рекомендациям, это поможет получить более достоверные данные о состоянии вашего здоровья.</i></p> <p><i>Приносим свои извинения за неудобства и ограничения на период времени, когда будут проводиться обследования.</i></p>		
Наименование обследования	МРТ без / с контрастом	

Обязательно приносить направления и выписки, данные предыдущих исследований касающиеся заболевания, по поводу которого Вы обследуетесь.

Если были операции с установкой металлических конструкций (болты, шурупы пластины, искусственные суставы) – принести выписку с указанием названия операции и из чего сделаны металлические конструкции.

МРТ органов брюшной полости, МРХПГ (МРТ желчных протоков)
(МРХПГ делается без контраста):

- В назначенный день обследования прийти натощак, или не принимать пищу, не пить 3-4 часа.
- За 3 дня до исследования диета (исключить черный хлеб, сырые овощи и фрукты, бобовые, квашенную капусту, молоко);
- За 3 дня эспумизан по 1 капсуле 3 раза в день;
- За час до исследования выпить 3 таблетки но-шпы по 40 мг;

МРТ органов малого таза (а так же прямая кишка):

Если МРТ прямой кишки назначается после проведения колоноскопии, между этими процедурами необходим перерыв 5-7 дней.

- Разрешен легкий завтрак
 - За 3 дня до исследования диета (исключить черный хлеб, сырые овощи и фрукты, бобовые, квашенную капусту, молоко);
- Умеренно наполненный мочевого пузырь. Не мочиться 60-90 мин.
За час до исследования выпить 3 таблетки но-шпы по 40 мг;

Подготовка кишечника: вечером накануне исследования очистительная клизма или слабительный чай при запорах, либо естественное опорожнение прямой кишки. За 2-3 часа до исследования естественное опорожнение прямой кишки.
За 3 дня эспумизан по 1 капсуле 3 раза в день;
за час до исследования выпить 3 таблетки но-шпы по 40 мг;

На полный мочевого пузырь!

МРТ мочевого пузыря:

- За 3 дня до исследования диета (исключить черный хлеб, сырые овощи и фрукты, бобовые, квашенную капусту, молоко);

- За 3 дня эспумизан по 1 капсуле 3 раза в день;
- за час до исследования выпить 3 таблетки но-шпы по 40 мг;
- за 1 час до исследования выпить 400-500 мл. любой жидкости.

Остальные виды МР-исследований подготовки не требуют